



# KÄNSÖ FLORA 1996



Lill Weibull

## KÄNSÖ FLORA

Under ett par dagar i juli 1994, i maj-juni-juli 1995 och två veckor i juli 1996 har jag haft förmånen att få vistas på Känsö och inventera floran där.

Då jag först kom dit gick jag under ledning av kapten Gustav Lundberg, sen fick jag ströva runt på egen hand och anteckna allt jag kände igen, leta i floran och examinera. Gustav Lundberg och jag har också tillsammans lett promenader med gäster på ön, då G L har pratat om öns historia och jag om växterna och i viss mån om fåglar. Första kvällen jag var på ön fick jag se ett häckande berguvspår med två ungar. Att det kändes överväldigande behöver inte poängteras.

Det har varit roligt och berikande att få vistas så mycket på ön. Jag har själv lärt mig mycket om floran och det har känts glädjande att få dela med sig av detta till unga och gamla som gästat ön.

Innan jag kom till Känsö hade jag läst kyrkoadjunkt John Erikssons skrivelse om floran 1966. Nu kunde jag jämföra och se vilka förändringar som skett sedan hans besök. De arter, som han påpekar hade försvunnit sedan Carl Skottsbergs inventering 1934, har jag inte heller kunnat hitta. Jag har inte heller hittat någon kamomillkulla, *Anthemis cotula* som J E funnit vid hamnen. Han kallar den surkulla, vilket är ett gammalt namn.

Ett träd som många "Känsökännare" skriver om är asklönn. Trädet går ej att finna, däremot finns ett par ex av traslind och man kan inte låta bli att fundera. Har det från början blivit en förväxling, som sen har fått hänga med, eller har det funnits en asklönn som sedan av någon anledning försvunnit?

Marrispen, som blivit ett slags signum för Känsö, var anledning till att professor Skottsberg begärde att ön skulle fridlysas. Den växte då på 1930-talet på en yta av "flera m<sup>2</sup>". Då John Eriksson kom till ön hade ytan utökats till c:a 10 m<sup>2</sup> och nu finns den på flera ställen och täcker säkert 100 m<sup>2</sup>.

I ruderatmark vid hamnen och nedanför tornet har nya arter t ex gul och vit sötväppling, revormstörel och gråbinka vuxit upp. I år har jag hittat sju ex av nattviol, som ej tidigare observerats.

Påtagligt i år är att antalet blommor är betydligt färre än förra året. En lång, kall, torr vinter och en ovanligt sen vår visar tydlig påverkan på växtligheten. Styvmorsviolerna finns det dock gott om. Strandkvannen har inte påverkats utan finns i riklig mängd.

Många arter, t ex brandlilja, brunröd daglilja, blå-lila iris (som jag inte kan bestämma), de flesta träden t ex bok, lind, ask, hästkastanj, kanadensisk kustgran, traslind har planterats av människor som bott här eller gästade ön troligen under karantänstiden. Lindarna nära husen skadades vid en brand 1965 men grönskar trots detta frodigt även i år. Nya skulle dock behöva planteras.

Något som är värt att observera är att ön är så ren och fri från skräp. Här hittar man inte som på nästan alla andra öar glas, plast, papper. Dels beror det naturligtvis på att det råder landstigningsförbud men mest på att militärerna älskar sin ö och sätter en ära i att hålla den fin. Det känns att alla tycker om att vara här och jag är glad att jag har fått vara en av dem.

Känsö i juli 1996

Lill Weibull

Artlista bifogas

# K Ä N S Ö F L O R A

Växter antecknade under besök på Känsö 5 - 7 juli, 1 sept 1994,  
3 - 9 maj, 29 maj, 10 juni, 2 - 15 juli 1995, 28 juni-12 juli -96

Den systematiska ordningen i Mossberg/ Stenberg "DEN NORDISKA  
FLORAN" har följts

Åkerfräken	<i>Equisetum arvense</i>
Skogsfräken	<i>E. sylvaticum</i>
Örnbräken	<i>Pteridium aquilinum</i>
Hultbräken	<i>Thelypteris phegopteris</i>
Svartbräken	<i>Asplenium trichomanes</i>
Majbräken	<i>Athyrium filix - femina</i>
Träjon	<i>Dryopteris filix - mas</i>
Skogsbräken	<i>D. carthusiana</i>
Lundbräken	<i>D. dilatata</i>
Ekbräken	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>
Stensöta	<i>Polypodium vulgare</i>
Gran	<i>Picea abies</i>
Vitgran	<i>P. glauca</i>
Kanadensisk kustgran	
Idegran	<i>Taxus baccata</i>
Tall	<i>Pinus sylvestris</i>
Bergtall	<i>P. mugo</i>
Svarttall	<i>P. nigra</i>
En	<i>Juniperus communis</i>
Gråvide	<i>Salix cinerea</i>
Bindvide	<i>S. aurita</i>
Sälg	<i>S. caprea</i>
Kryppvide	<i>S. repens</i>
Asp	<i>Populus tremula</i>
Poppel	<i>P. nigra</i>
Pors	<i>Myrica gale</i>
Vårtbjörk	<i>Betula pendula</i>
Glasbjörk	<i>B. pubescens</i>
Klibbal	<i>Alnus glutinosa</i>
Gråal	<i>A. incana</i>
Hassel	<i>Corylus avellana</i>
Bok	<i>Fagus sylvatica</i>
Ek	<i>Quercus robur</i>
Bergek	<i>Q. petraea</i>
Alm	<i>Ulmus glabra</i>
Brännässla	<i>Urtica dioica</i>
Trampört	<i>Polygonum aviculare</i>
Vattenpilört	<i>P. amphibium</i>
Åkerpilört	<i>P. persicaria</i>
Vanlig pilört	<i>P. lapathifolium</i>
Åkerbinda	<i>Fallopia convolvulus</i>
Gårdsskräppa	<i>Rumex longifolius</i>
Krusskräppa	<i>R. crispus</i>
Tomtskräppa	<i>R. obtusifolius</i>
Ångssyra	<i>R. acetosa</i>
Bergsyra	<i>R. acetosella</i>
Strandbeta	<i>Beta vulgaris</i>



Svinmälla  
Fiskmälla  
Strandmälla  
Vägmälla  
Spjutmälla  
Glasört  
Saltört  
Sandnarv  
Skogsnarv  
Saltarv  
Vatarv  
Grässtjärnblomma  
Hönsarv  
Vårarv  
Knutnarv  
Sylnarv  
Krypnarv  
Grönknavel  
Vitknavel  
Åkerspängel  
Rödnarv  
Saltnarv  
Havsnarv  
Gökblomster  
Tjärblomster  
Backglim  
Strandglim  
Bergglim  
Såpnejlika  
Backnejlika  
Vitsippa  
Kabbleka  
Smörblomma  
Majsmörblomma  
Revsmörblomma  
Svalört  
Akleja  
Berberis  
Jordrök  
Vägsenap  
Backtrav  
Bergkårel  
Sommargyllen  
Ångsbräsma  
Lundtrav  
Nagelört  
Skörbjuggsört  
Lomme  
Gatkrassing  
Peningört  
Kürsenap  
Marviol  
Strandkål  
Kärleksört  
Vit fetknopp  
Gul fetknopp  
Mandelblomma  
Krusbär  
Älgört  
Hallon  
Blåhallon  
Björnbär

Chenopodium album  
C. polyspermum  
Atriplex littoralis  
A. patula  
A. prostrata  
Salicornia europaea  
Suaeda maritima  
Arenaria serpyllifolia  
Moehringia trinervia  
Honckenya peploides  
Stellaria media  
S. graminea  
Cerastium fontanum  
C. semidecandrum  
Sagina nodosa  
S. subulata  
S. procumbens  
Scleranthus annuus  
S. perennis  
Spargula arvensis  
Spergularia rubra  
S. marina  
S. media  
Lýchnis flos-cuculi  
L. viscaria  
Silene nutans  
S. maritima  
S. rupesstris  
Saponaria officinalis  
Dianthus deltooides  
Anemone nemorosa  
Caltha palustris  
Ranunculus acris  
R. auricomus  
R. repens  
R. ficaria  
Aquilegia vulgaris  
Berberis vulgaris  
Fumaria officinalis  
Sisymbrium officinale  
Arabis thaliana  
Erysimum hieracifolium  
Barbarea vulgaris  
Cardamine pratensis  
Arabis hirsuta  
Erophila verna  
Cochlearia officinalis  
Capsella bursa-pastoris  
Lepidium ruderale  
Thlaspi arvense  
Diplotaxis muralis  
Cakile maritima  
Crambe maritima  
Sedum telephium  
S. album  
S. acre  
Saxifraga granulata  
Ribes uva-crispa  
Filipendula ulmaria  
Rubus idaeus  
R. caesius  
R. plicatus

Vresros  
Stenros  
Nyponros  
Hartsros  
Småborre  
Humleblomster  
Nejlikrot  
Kräklöver  
Gåsört  
Femfingerört  
Blodrot  
Smultron  
Backsmultron  
Daggkäpa  
Äpplé  
Päron  
Rönn  
Oxel  
Oxbär  
Rundhagtorn  
Trubbhagtorn  
Slån  
Sötkörsbär  
Hägg  
Kråkvicker  
Duvvicker  
Sparvvicker  
Häckvicker  
Gulvial  
Backvial  
Stallört  
Vit sötväppling  
Gul sötväppling  
Vitklöver  
Jordklöver  
Harklöver  
Rödklöver  
Käringtand  
Getväppling  
Harsyra  
Mjuknäva  
Sparvnäva  
Fliknäva  
Stinknäva  
Skatnäva  
Jungfrulin  
Vildlin  
Revormstörel  
Kärrtörel  
Lönn  
Tysk lönn  
Hästkastanj  
Getapel, Vägtorn  
Brakved  
Bohuslind  
Lind  
Traslind  
Parklind  
Rödmalva  
Äkta Johannesört  
Fyrkantig Johannesört

Rosa rugósa även vit  
R. canína  
R. dumális  
R. villósa  
Agrimónia eubatória  
Geum rivále  
G. urbánum  
Potentilla palústris  
P. anserína  
P. argénta  
P. erécta  
Fragária véscá  
F. víridis  
Alchemilla vulgáris  
Malus doméstica  
Pyrus commúnis  
Sorbus aucupária  
S. intermédia  
Cotoneáster integérrimus  
Crataégus laevigáta  
C. monógyna  
Prunus spinósa  
P. ávium  
P. padus  
Vícia cracca  
V. hirsúta  
V. tetraspérma  
V. sépium  
Láthyrus praténsis  
L. sylvéstris  
Onónis arvénsis  
Melilótus álba  
M. officinális  
Trifólium répens  
T. campéstre  
T. arvénsé  
T. praténsé  
Lótus corniculátus  
Anthýllis vulnerária  
Óxalis acetosélla  
Geránium molle  
G. pusíllum  
G. disséctum  
G. robertiánum  
Eródium cicutárium  
Polýgala vulgáris  
Linum cathárticum  
Euphórbia helioscónia  
E. palústris  
Acer platanóides  
A. pseudoplátanus  
Aésculus hippocástanum  
Rhamnus cathárticus  
Frángula alnus  
Tília platyphýllos  
T. cordáta  
T. platyphýllos s. laciniáta  
T. vulgáris  
Malva sylvéstris  
Hypericum perforátum  
H. maculátum

Underviol  
Skogsviol  
Ängsviol  
Kärrviol  
Luktviol  
Styvmonsviol  
Päckelblomster  
Rallarros, Njökört  
Rosendunört  
Bergdunört  
Hönsbär  
Murgröna  
Hundkäv  
Bockrot  
Kirsål, Kers  
Vildpersilja  
Krussilja  
Strandloka  
Strätta  
Strandkvanne  
Kärrsilja  
Ljung  
Lingon  
Blåbär  
Odon  
Kråkbär  
Gullviva  
Videört, Strandlysing  
Skogsstjärna  
Strandkrypa  
Strandtrift  
Bohusmarrisp  
Ask  
Syren  
Vintergröna  
Vattenmåra  
Gulmåra  
Stormåra  
Snärjmåra  
Snärvinde  
Vallört  
Åkerförgätmigej  
Backförgätmigej  
Skogsförgätmigej  
Sumpförgätmigej  
Blåsuga  
Vitolister  
Rödplister  
Flikolister  
Brunört  
Jordreva  
Strandklo  
Nattskatta  
Besksöta  
Flenört  
Gulsporre  
Fingerborgsblomma  
Strandveronika  
Teveronika  
Ärenpris  
Majveronika  
Trädgårdsveronika

*Viola mirabilis*  
*V. riviniána*  
*V. canína*  
*V. calústris*  
*V. odoráta*  
*V. trícólor*  
*Lythrum salicária*  
*Boilóbium angustifólium*  
*E. hirsútum*  
*E. montánum*  
*Cornus suecica*  
*Hédera hélix*  
*Anthrísacus sylvéstris*  
*Pimpinélla saxífraga*  
*Aegopódium podagrária*  
*Aethúsa cynápium*  
*Selínium carvifólia*  
*Ligústicum scóticum*  
*Angélica sylvéstris*  
*A. litorális*  
*Peucedánum balústre*  
*Callúna vulgáris*  
*Vaccínium vitis-idaea*  
*V. myrtillus*  
*V. uligonósum*  
*Empetrum nígrum*  
*Prímula véris*  
*Lysimáchia vulgáris*  
*Trientális eurobaea*  
*Glaux marítima*  
*Arméria marítima*  
*Limónium húmile*  
*Fráxinus excélsior*  
*Syrínga vulgáris*  
*Vinca mínor*  
*Gálium balústre*  
*G. vérum*  
*G. álbum*  
*G. aparíne*  
*Calystégia scéium*  
*Sýmchyttum officinále*  
*Myosótis arvénse*  
*M. ramosíssima*  
*M. sylvática*  
*M. laxa*  
*Ajúga pyramidális*  
*Lámium álbum*  
*L. purpúreum*  
*L. híbridum*  
*Prunélla vulgáris*  
*Glechóma hederácea*  
*Lýcopus eurobaeus*  
*Solánium nígrum*  
*S. dulcamára*  
*Scrophulária nodósa*  
*Linária vulgáris*  
*Digitális purpúrea*  
*Verónica longifólia*  
*V. chamaédrys*  
*V. officinális*  
*V. serpyllifólia*  
*V. pérsica*

Angskovall  
Groblad  
Svartkämpar  
Gulkämpar  
Olvon  
Snöbär  
Vildkaprifol  
Skogstry  
Vårklynne  
Vänderot  
Angsvädd  
Blåklocka  
Knölklocka  
Gullris  
Tusensköna  
Strandaster  
Gräbinka  
Sumponoppa  
Åkerkulla  
Nysört  
Röllika  
Baldersbrå  
Kustbaldersbrå  
Gatkamomill  
Prästkrage  
Renfana  
Gräbo  
Hästhov  
Korsört  
Klibbkorsört  
Bergkorsört  
Kardborre  
Åkertistel  
Kärrtistel  
Vägtistel  
Rödklint  
Blaklint  
Höstfibbla  
Svinrot, Kornfibbla  
Kålmolke, Mjölktistel  
Åkermolke  
Skogssallat  
Maskros  
Harkål  
Gräfibbla  
Hagfibbla  
Flockfibbla  
Havssälting  
Värlök  
Brandlilja  
Brunröd daglilja  
Pärlhyacint  
Gräslök  
Backlök  
Skogslök  
Sandlök  
Liljekonvalj  
Ekorrbär  
Getrams  
Storrans

Melamóyrum pratense  
Plantágo major  
P. lanceoláta  
P. marítima  
Vibúrnur ópulus  
Symphoricárus rivuláris  
Lonicéra periclymenum  
L. xylósteum  
Valerianélla locústa  
Valeríana officinális  
Succísa praténsis  
Campánula rotundifólia  
C. rapunculoides  
Solidágo virgáurea  
Bellis perénnis  
Aster tribólíum  
Erígeron acer  
Gnaphálium uliginósum  
Ánthemis arvénsis  
Achilléa ptármica  
A. millefólium  
Matricária perforáta  
M. marítima  
Chamomílla suavéolens  
Leucánthemum vulgáre  
Tanacétum vulgáre  
Artemísia vulgáris  
Tussilágo fárfara  
Senécio vulgáris  
S. viscósus  
S. sylváticus  
Árctium minus  
Círcium arvénse  
C. palústre  
C. vulgáre  
Centauréa scéa  
C. cýanus  
Leóntodon autumnális  
Scorzonéra húmilis  
Sónchus oleráceus  
S. arvénsis  
Lactúca murális  
Taráxacum grupp Vulgária  
Lápsana comúnis  
Hierácium pilosélla  
H. grupp Vulgatifórmia  
H. umbellátum  
Triglóchin marítima  
Gágea lútea  
Lílium bulbíferum  
Hemerocállis fulva  
Múscari botryoídes  
Állium schoenóprasum  
A. oleráceum  
A. scorodóprasum  
A. vineále  
Convallária majális  
Maiánthemum bifólium  
Polygónatum odorátum  
P. multiflórum



Svärdslilja  
Iris  
Veketåg  
Knapptåg  
Stubbtåg  
Salttåg  
Syltåg  
Löktåg  
Ryltåg  
Vägtåg  
Angsfryle  
Knippfryle  
Vitfryle  
Värfryle  
Färsvingel  
Rödsvingel  
Engelskt rajgräs  
Vitgröe  
Angsgröe  
Berggröe  
Lundgröe  
Saltgräs  
Revtigt saltgräs  
Hundäxing  
Darrgräs  
Taklosta  
Foderlosta  
Luddlosta  
Strandråg  
Lundelm  
Kvickrot  
Knylhavre  
Tuvtätel  
Krustätel  
Värtätel  
Luddtätel  
Värbrodd  
Brunven  
Bergven  
Rödven  
Kryppen  
Sandrör  
Bergrör  
Angskavle  
Vass  
Knägräs  
Stagg  
Blätätel  
Havssäv  
Angsull  
Tuvull  
Piggstarr  
Sandstarr  
Plattstarr  
Flaskstarr  
Hirsstarr  
Blekstarr



Iris pseudácorus  
I. Sibírica ?  
Juncus effúsus  
J. conglomerátus  
J. compréssus  
J. gerárdi  
J. ténuis  
J. bulbósus  
J. articulátus  
J. bufónius  
Lúzula multiflóra  
L. campéstris  
L. luzuloídes  
L. pilósa  
Festúca ovína  
F. rubra  
Lólium perénne  
Poa ánnua  
P. praténsis  
P. compréssa  
P. nemorális  
Puccinélia retrofléxa  
P. marítima  
Dáctylis glomeráta  
Briza média  
Bromus tectórum  
B. inérmis  
B. hordeáceus  
Léymus arenárius  
Élymus canínus  
E. repens  
Arrhenátherum elátius  
Deschámpsia cespitósa  
D. flexuósa  
Áira oraécox  
Holcus lanáta  
Anthoxánthum odorátum  
Agróstis canína  
A. vineális  
A. capilláris  
A. stolonífera  
Ammóphila arenária  
Calamagróstis epigéios  
Aloocúrus praténsis  
Phragmites austrális  
Danthónia decúbens  
Nárdus stricta  
Molína caerúlea  
Scirpus marítimus  
Eriophórum angustifólium  
E. vaginátum  
Carex spicáta  
C. arenária  
C. dísticha  
C. rostráta  
C. panícea  
C. palléscens

Hundstarr  
Loppstarr  
Harstarr  
Stjärnstarr  
Nattviol

Carex nígra  
C. pulicáris  
C. leporína  
C. echináta  
Platanthéra bifólia

Tack till Ingvar Nordin, Birgitta Herloff och Lars Hellman  
som hjälpt mig med det jag inte kunde!

Lill Weibull




Akerfräken, *Equisetum arvense*

Skogsfräken, *E. sylvaticum*

Alla växter har inte blommor men ofta vackra blad. Titta på ormbunksväxter och jämför dem med varandra. Fräken tillhör ormbunksväxterna. De får inga blommor eller frön. De sprids med hjälp av sporer i ett ax. Det finns flera olika sorters fräken. Här är två som är vanliga. Stjälkarna är ihålliga och har tunna, trädlika blad i kransar. Skogsfräken liknar en liten gran


arvense betyder aker  
sylvaticum betyder skog



Stensöta, *Polypodium vulgare*

Stensöta är vanlig. den växer ofta på bergväggar, i skrevor och vid stenar. På undersidan av bladen sitter sporsamlingar, som den förökar sig med. Titta med luppen.


vulgare betyder att den är vanlig



Ekbräken, *Gymnocarpium dryopteris*

Hultbräken, *Thelypteris phegopteris*

Många ormbunksnamn slutar på bräken. Se i en flora. Här är två av dem. Titta noga så kan du lätt skilja dem från varandra. Båda är ganska små, 20-30 cm. Hultbräken har de två nedersta bladen nedåtriktade som mustascher - ett bra "kom ihåg". På Känsö finns också örnbräken, majbräken, lundbräken, svartbräken och träjon.






## En, Juniperus communis

Enen kan växa som träd eller buske och ibland är den låg och krypande utmed marken. Den kan bli mycket gammal, mer än 1000 år. På försommaren blommar enen, då ryker hanblommornas frömjöl i moln runt enen, den vindpollineras. Frukterna är små "bärkottar", som mognar långsamt under två år. Den första hösten är de gröna, den andra mognar de och blir blåsvarta. De användes som krydda till viltstek, till enbärndricka och till gin och genever. Enris användes vid rökning av skinka, korv och fisk. Förr trodde man att man kunde fördriva sjukdomar med rökning av enris i sjuksalar. Eheträ användes till smörknivar, byttor, knappar, brickor och andra småsaker. Förr byggde man gärdsgårdar av enstörar och band ihop dem med barken, som är seg och stark. Enekvistar över dörren jagar bort häxor.

Engallmyggan lägger ägg på barren, som blir tjocka och växer ihop kring ägget. Där inne kläcks ägget till en liten orangefärgad larv, som blir en ny engallmygga. De gallbildningarna kallas kikbär, för man kokade dem i mjölk och gav den som medicin mot kikhosta. Det är inte konstigt att man förr fick lära sig att hälsa på denna hjälpsamma buske.



## Pors, Myrica gale

Pors är en liten grenig buske, som växer vid vattendrag. Den blir c:a 50 cm hög. Kvistarna är rödbruna och har hartsrika körtlar, som utsänder en stark doft. Gnugga blad och knoppar, så känner du väldof-ten. Han- och honblommor sitter på skilda buskar och blommar innan bladen slagit ut. Förr användes bladen till smaksättning av öl och mjöd, nu till brännvinskrydda.



Trampört, *Polygonum aviculare*

Trampörten är vanlig vid kanten av gårdvägar och i gräsmattor. Titta genom luppor så ser du hur vackra blommor den har. De kan vara vita, rosa eller röda. Den är en krypande och därför lägger man inte så lätt märke till den.

Man ser ofta en flock sparvar, som äter på gräsmattan. Då är det ofta trampörten som lockar. Det t o m hörs hur de äter.

*avicularis* betyder att det ät fågelmat



Ängssyra, *Rumex acetosa*

Bergssyra, *Rumex acetosella*

Bergssyran brukar vara mindre och knäppare än ängssyran.

Om du tycker att det är svårt att komma ihåg vilken du har framför dig, så kan du få mitt "kom ihåg knep": bergssyran måste vika upp bladspetsarna för att inte stöta mot berget. Smaka på blad. *acetosa* betyder syrlig, *acetosella* något syrlig.



Pilört, *Polygnum amphibium*

Det finns flera olika sorters pilört. De växer både på land och i vatten och blommorna har varierande färg, vit, grön, röd. Titta hur växten ser ut vid bladfästena, så förstår du varför den hör till "Slidknäväxterna" amphibium betyder att den växer både på land och i vatten.



Gårdsskräppa, *Rumex longifolius*.

Skräppor blir ganska högvuxna och får tätt med blommor. De vissna skräpporna står kvar hela vintern. Har du som jag plockat av de bruna frukterna och lekt att det är kaffe? Det finns fler arter skräppa. *longifolius* betyder långa blad



Grässtjärnblomma, *Stellaria graminea*

Grässtjärnblomma är vanlig.

Blommorna är vita och c:a 1 cm i diameter.

stellaria betyder att blomman är stjärnlik, graminea att växten är gräslik.

Den tar ofta stöd av andra växter.



Rödnary, *Spergularia rubra*

Rödnary är en liten nedliggande ört med rödvioletta blommor. Bladen är korta, tråksmala och klibbiga. Den växer i kanten av gräsmattor och på flera ställen utmed naturstigen där det är torrt.

rubra betyder röd





Strandglim, *Silene maritima*

Strandglim växer på torra, grusiga ställen vid havsstranden. Blommorna är vita. Foderbladen är sammanväxta och ser ut som en uppblåst ballong.

maritima betyder att den växer vid havet




Bergglim, *Silene rupéstris*

Bergglim är mycket mindre än strandglim och har små, vita blommor. Vissa år blommar den mycket rikligt på berg och i skrevor. Den finns på flera ställen där det finns berg.

rupéstris betyder att den växer på klippor


Det är ganska vanligt att denna (och vissa andra) nejlikväxter har blommor, som ser smutsiga ut. De är då angripna av en parasit, en sotsvamp, som sitter i ståndarknapparna



Vitsippa, *Anemone nemorosa*

Vitsippan är nog vår mest älskade vårblomma. Alla känner igen den. Den växer i skog, hagar och på ängar och har en lång rotstam från vilken det växer upp nya vitsippor. I fröna finns en olja som myrorna tycker om, så de hjälper till att sprida växten.

nemorosa betyder växer i lundar



Kabbleka, *Caltha palustris*

Kabblekan har ganska stora, gula blommor och kraftiga stjälkar. Den växer på fuktiga ställen och blommar i maj-juni. Fröna kan flyta och sprids med vatten. Du hittar kabblekan vid många vattendrag.

palustris betyder att den växer i kärr.



Vanlig smörblomma, Ranunculus acris

Denna smörblomma är upprättstående  
och kan bli ganska hög, c: 30 cm  
Den blommar i maj-juni


acris betyder skarp, bitter



Majsmörblomma, Ranunculus auricomus

Som namnet säger blommar denna i  
maj först av alla smörblommor.  
Kronan är oregelbunden, alla kron-  
bladen är inte lika stora, blomman  
ser skadad ut.

auricomus betyder gullhårig



Svalört , *Ranunculus ficaria*

Svalörten har gula blommor och nästa hjärtlika blad. Den blommar tidigt på våren samtidigt med vårlök och vitsippor. Det är lätt att veta att det inte är smörblomma. Den kommer senare. Bladen är blanka och glatta. Den har tjocka rötter med näring, som gör att den blommar tidigt. Den trivs bäst på fuktig mark. Efter häftiga regnskurar kan blommor och förna på marken spolas bort, så att de ljusa uppsvällda rötterna blir liggande synliga på jorden. Det trodde man förr var ett järkecken-"det hade regnat himlavete". Men det vetet är gottigt.

*ficaria* betyder fikon, det syftar på tjocka rötterna



Revsmörblomma, *Ranunculus repens*

Det finns många olika sorters smörblommor och en av dem på Kängö är revsmörblomman. Man känner igen den på att bladens mittlob är skaftad. Det bildas långa revor, som slår rötter så att det blir nya plantor. Den blommar i juni.

*repens* betyder att den har krypande revor





Sommargyllen, Barbaréa vulgáris

Sommargyllen blommar från maj och långt in på sommaren med gula blommor. Säg namnet och hör hur vackert det låter. Den får frön i långa skidor.


vulgáris betyder att den är vanlig



Nagelört, Eróphila verna


Tidigt, ibland innan snön smält, kan du hitta nagelörten vid klippor, berghällar och på sandiga ställen. Den är mycket liten i början så du får titta noga. Den har små, vita blommor och får små, ovala, något spetsiga frökapslar, som någon tycker liknar babynaglar — därav namnet.

verna betyder att den blommar på våren



Skörbjuggsört, *Cochleária officinális*

På stränderna blommar skörbjuggsörten i maj-juni med vita blommor. Blåcen är blanka, tjocka och köttiga. De innehåller mycket C-vitamin. Därför plockade sjömän växten och åt för att motverka C-vitaminbrist som kunde ge upphov till skörbjugg, när de var ute på långfärd och inte hade tillgång till frukt eller grönsaker



Lomme, *Capsella bursa-pastóris*


Lomme är en mycket vanlig växt med små, vita blommor. Den börjar blomma i maj och blommar sen hela sommaren. Namnet har den fått av formen på frökapslarna, som liknar en läderpåse med pengar, som herdarna förr hade hängande vid livremmen.

capsella=kapsel, bursa=börs, pastoris=herde, lomme=ficka




Marviol, *Cakile marítima*

Bland stenar vid stranden växer marviolen. Bladen är kala och köttiga, blommorna är violetta och väldoftande. Den tillhör familjen korsblomiga och är inte alls någon viol. Namnet är alltså ganska missvisande. Marviolen blommar under senare delen av sommaren.



Kärleksört, *Sedum teléphium*


På bergiga, steniga ställen växer kärleksörten, som blommar från juli långt in på hösten med gulgröna blommor. Stjälkarna är rödaktiga och bladen blanka, köttiga med mycket vatten i. Vissna blommor kan stå kvar under vintern.



Gul fetknopp, *Sedum acre*

Fetknoppen blommar med gula, vackert symmetriska, stjärnlika blommor på stenar och berghällar i juni. Bladen är små, tjocka, äggformiga och kan lagra mycket vatten. Växten är grön året om.

acre betyder att den har skarp, bitter smak



Vit fetknopp, *Sedum album*

Bland stenar och berg växer vit fetknopp rikligt och ofta mattbildande. Blommorna är vita på upprätta greniga skaft. Bladen är små, korblika, tjocka och ofta brunröda till färgen. Växten är vintergrön och blommorna står kvar som vinterståndare till nästa blomning.

album betyder vit



Björnbär, *Rubus*

Björnbär är en av de bärbuskar, som växer på Kängö. Björnbärsbuskarna har vita eller skära blommor. Bären består av många små stenfrukter, som sitter tätt tillsammans. De mognar sent på sommaren och är inte goda förrän de blivit alldeles svarta.

På Kängö växer också hallon och blåhallon

Nyponros, *Rosa dumalis*



Blommorna på nyponbuskar kan ha mycket varierande färger - vita, skära, röda. Blommorna kallas nyponrosor. Busken har många vassa taggar. Frukterna är små-ludna nötter, som sitter inne i nyponet, en skenfrukt. Många fåglar tycker om att äta nypon. Flera växter har fått namnet ros utan att vara en egentlig ros: vätteros, stockros, julros, och oändliga är de sagor och berättelser, som beskriver de underbara vildrosorna. På nyponbuskens blad kan man hitta stora, mosslika nystan. De orsakas av en liten gallstekel och innehåller flera larver. I gammal folk-tro gav dessa nystan sömn och kal-las därför sömntorn. Man kunde köpa dem på apotek. Linné skriver i en av sina reseskildringar att man lade sömntorn i barnens vagnar och äldre personers sängar för att ge ro och sömn.






Kråkklöver, *Potentilla palustris*

Kråkklöver blommar hela sommaren med brunröda stjärnlika blommor. Det är ingen klöverväxt.

palustris betyder att den växer i kärr.



Humleblomster, *Geum rivale*

På fuktiga ställen växer humleblomster. Den har hängande blommor med vitgula eller svagt rosa kronblad. Foderbladen som syns mest, är brunröda och håriga. Förväxla den inte med kråkklöver. Den kallas ibland för mormors nattmössa rivale betyder att den växer vid bäckar



Blodrot, *Potentilla erecta*

Växten har fått sitt namn av att jordstammen inuti är röd. Den har gula blommor med fyra kronblad.  
*erecta* betyder upprätt



Femfingerört, *Potentilla argentea*

Femfingerörten har gula blommor med fem kronblad.  
Jämför med blodroten

*argentea* betyder att bladen är silvervita på undersidan



Gåsört, *Potentilla anserina*

Gåsörten är vanlig. Den växer krypande utmed marken och får långa revor. Bladen är grågröna och silverhåriga på undersidan. Blommorna är gula ungefär 2 cm stora.

anserina betyder gås, den växer ofta på stränder där gässen bet



Gulvial, *Lathyrus pratensis*

Gulvial har klängen med vilken den klänger sig fast vid andra växter. Frukten är en balja, som blir brunsvart.

pratensis betyder att den växer på ängar



Kråkvicker, *Vicia cracca*

Kråkvicker har många blåviolettera blommor i klase på stjälken. Bladen har klängen, som slingrar sig om andra växter, så att kråkvickern kan hålla sig upprätt. Den blommar hela sommaren. Fåglar äter gärna fröna, när, baljorna spricker



Häckvicker, *Vicia sepium*

Häckvickern har färre blommor på stjälken än kråkvickern, men varje blomma brukar vara större och mera rödviolett än kråkvickern. Den har klängen och klänger upp i andra växter.

sepium betyder växer vid häckar.




Sötväppling, Mililótus officinális

Vid hamnen på ruderatmark växer gul och vitsötväppling. Det är en 60-70 cm hög växt med gula eller vita blommor i smal klase.

Officinalis betyder att den använts som medicin.

Den vita benämns alba som betyder vit




Käringtand, Lotus corniculátus

På torra ställen växer käringtand med gula eller gulorange blommor i flock. Den har inte klängen som gulvial och är mera lågvuxen. Den blommar i juni-juli. Baljorna är uppåtstående.

corniculatus betyder med små horn





Vitklöver, *Trifolium repens*

Både vit och rödklöver växer lite varstans på Känso. Vitklövern har nedliggande stjälkar, som slår rot på flera ställen vid bladfästena. Det som vi kallar blomma är många små blommor, som sitter tätt tillsammans i en blomställning. De är vita, ibland med en skär ton och blir bruna. Blommar hela sommaren.

Latinska namnet betyder att den har tre blad och är krypande



Rödklöver, *Trifolium pratense*

Alla känner nog igen rödklöver, som är vanlig och blommar hela sommaren


pratense betyder växer på ångar



Harsyra, *Oxalis acetosella*

På skuggiga ställen växer harsyra. Alla barn brukar smaka på bladen och vet att de smakar syrligt. Blommorna kommer i maj och är vita med skära, ibland violetta strimmor. Bladen liknar klöverblad, de är gröna hela vintern. De viker ihop sig i solsken för att inte torka.

*acetosella* betyder något syrlig



Johannesört, *Hypericum perforatum*  
" *maculatum*

Det finns olika sorters Johannesört. Vanligast är äkta Johannesört med två kanter på stjälken och fyrkantig Johannesört med fyrkantig stjälek. De är mycket lika varandra och inte lätta att se skillnad på för den som inte är van. Den äkta Johannesörten har genomskinliga prickar på bladen. Det syns om du håller ett blad mot ljuset. Gnider du knoppar och blommor mellan fingrarna blir du röd. Växtsaften innehåller hypericin, ett ämne som blir rött när det kommer i kontakt med syre i luften. Johannesört är en gammal brännvinskrydda - mannablod eller hirkumpirkum

*perforatum* betyder genomborrad och *maculatum* fläckig



Styvmorsviol, *Viola tricolor*

I bergskrevorna blommar vissa år massor med styvmorsviol, andra år mindre. Blomman har tre färger: gult i mitten, två mörklila kronblad överst och de andra tre ljusare lila. Det nedersta, största kronbladet har mest gult. Det är sagans styvmor, som tog det mesta smöret till sig själv. Mörka linjer på kronbladen visar vägen in till mitten, där insekter ska hitta nektar. tricolor betyder trefärgad



Skogsviol, *Viola riviniana*


Det är inte lätt att skilja alla violer från varandra. Det finns flera arter på Känsö. Skogsviol är en av dem, den blommar i maj-juni



Rallarros, *Epilobium angustifolium*

Rallarrosen har många olika namn. Mjölkört är ett av dem. Man trodde förr att om kor åt av växten gav de mycket mjölk, därför fick den namnet mjölkört eller mjölke. Rallarros heter den därför att den alltid växte upp där rallarna byggde järnväg. Den är vanlig på torr mark, blir ofta mycket hög och blommar med röda blommor mot slutet av sommaren. Sällsynt finns den med vita blommor (jmf vit ljung). Fröna är håriga och sprids med vinden, när de korkskrusliknande frökapslarna spricker på sensommaren och hösten. Titta också på växten på vintern.

angustifolium betyder att den har smala blad



Dunört, *Epilobium montanum*

Det finns flera olika arter dunört. Bergdunört är en som finns på Känsö. Den är mycket mindre än rallarrosen och har blekare blommor.


montanum betyder att den växer på berg



Skogsstjärna, *Trientalis europæa*

De vita blommorna gör verklig skäl för namnet. De lyser som stjärnor inne i skogen när de blommar i juni på tunna stjälkar i växtens topp.

Skogsstjärnan är Värmlands landskapsblomma.



Hönsbär, *Cornus suecica*

Hönsbär är ingen vanlig växt på Känsö. Egentligen är den en fjällväxt, som växer rikligt på våta fjällhedar. Växten är liten, 10-15 cm hög. Den har små, svartröda blommor tätt tillsammans. Under dem sitter fyra vita svepeblad, som man lätt kan tro är blomma. När blommorna vissnat, får växten röda bär med ett frö i och på hösten är hela växten rödlila till färgen.

suecica betyder svensk




Kärrtörel, *Euphorbia palustris*



Lysande gul blommor kärrtöreln på försommaren på öarnas stränder. Den växer på flera ställen på Käsö. Den är storvuxen med kraftig, ihålig stam. Bladstjälkarna innehåller vit, giftig mjölksaft.

palustris betyder växer i kärr

Vid hamnen i ruderatmark växer den mindre släktingen revormstörel



Strandkvanne, *Angelica litoralis*

Strandkvanne växer rikligt bland stenblock utmed Käsös stränder. Det latinska namnet betyder ängel och en legend berättar att det var en ängel som lärde munkar i ett kloster att använda kvannen som medicin. Bladen kunde användas som lugnande medel, roten mot förstoppning, frukterna var urindrivande. Man kunde koka blad och stjälkar och äta som vi idag gör med spenat och sparris. Munkarna kom sedan på att fröna kunde pressas och smaksätta D.O.M. — Benediktinerlikör.

Kirskål, *Aegopódium podagraria*



Kirskålels blad kommer tidigt och bildar ett grönt täcke på vissa områden. I trädgårdar är den ett hatat ogräs. Man kan äta bladen som sallad och stuvning. Blommorna kommer i juli och många tror att det är hundkåx, men man ser lätt skillnad på bladen. Om man gnuggar bladen känner man att den har krydddoft. Den kallas också kers eller skvallerkål, den påstås spridas snabbare än käringskvaller.


Namnet podagraria talar om att den använts som medicin mot podager (gikt) som är en värksjukdom i lederna.



Kärrsilja, *Peucedanum palustre*

Kärrsilja växer vid stränderna. Den blommar i juli med små vita blommor i flock. Bladen är bruna allra ytterst på spetsarna.

palustre betyder att den växer i kärr.



Hundkåx, *Anthriscus sylvestris*


Hundkåx kallas också hundloka. Det är en växt som har ökat snabbt senare år. Det beror på mycket kväve i naturen. Det är den vanligaste av våra flockblomstriga växter och den pryder på försommaren dikeskanter, skogsbryn och ängar med sitt vita flor, som ser ut som brudslöjor. Varje flock har många små blommor.

sylvestris betyder vild eller växande i skog

Hundkåx, kärrsilja och kirskål tillhör familjen flockblomstriga, som har många arter, flera användes som krydda (kummin, dill, fänkål, koriander, persilja, palsternacka, morot), men det finns också flera giftiga (odört, vildpersilja, sprängört). En viktig familj alltså.

Kråkbär, Empetrum nigrum

Bland lingonris och blåbär växer ett ris, som heter kråkris eller kråkbär. Bladen är barrlika och sitter kvar under vintern. Blommorna är små och oansenliga. Bären blir blåsvarta. nigrum betyder svart




Marrisp, Limonium humile

På den steniga stranden, som delvis översilas av saltvatten, växer marrisp talrikt. Den har spridit sig mycket under senare år. Saltvatten gynnar frönas grobarhet. Marrispen blommar i augusti med ljuslila blommor i ensidiga, täta ax på greniga, styva stjälkar. Marrispen har blivit symbol för Käsö flora.



Vitplister, *Lamium album* (blindnässla)

Många tror att det är en brännässla, men känn på den, så märker du att den är mjuk. Den är vanlig och blommar under stor del av året. Tag en blomma och sug. Då förstår du varför bin och humlor gärna besöker den.  
album betyder vit



Rödplister, *Lamium purpureum*

I april-maj blommar rödplister med små purpuröda blommor.

purpureum betyder purpurfärgad






Gulsporre, Linaria vulgaris

Under senare delen av sommaren hittar du gulsporre lite varstans. Den har många lysande, gula blommor samlade i tät klase. Varje blomma har en lång sporre med nektär, som lockar humlor och bin. vulgaris betyder att den är vanlig



Snårvinda, Calystégia sépium

Upp i buskarna slingrar snårvindan med vita stora blommor. Den blommar i juli. sépium betyder att den växer vid häckar



Teveronika, Veronica chamaedrys

Det finns många veronikor, men den som de flesta lägger märke till är teveronikan med himmelsblå blommor och vita ståndare. Många kallar den för mormors glasögon. Titta på ståndarna så förstår du varför. De är två till antalet.


chamaedrys betyder dväргеk




Ängskovall, Melampyrum pratense

Ängskovall hittar du blommande i juli-augusti. Blommorna är vitgula. Man säger att den är halvparasitisk. Det betyder att den tar en del av sin näring från andra växters rötter. Den svartnar vid torkning - melanos betyder svart.

pratense betyder äng





Groblad, Plantågo major

Groblad kallas ibland för läkeblad. Man använde förr bladen att lägga på sår. Bladen är stora och breda och har kraftiga nerver. Axen, som växer upp på en lång stjälk från mitten av bladrosetten, innehåller många tättsittande blommor. Du kan se hur ståndarna sticker ut när den blommar.

Fåglarna tycker om fröna.  
major betyder stor



Svartkämpar, Plantågo lanceolata

Svartkämpar har inte så breda blad som groblad. De är smala, lansettlika (= lanceolata). Axen är korta och mörka nästan svarta. När de blommar ser man gulvita ståndare som sticker ut. Både groblad och svartkämpar är vanliga.



Kaprifol, *Lonicera caprifolium*

Kaprifol kan inte växa upprätt av sig själv. Den är en av Sveriges tre vilda lianer och slingrar sig kring andra träd och buskar. Den kan också växa uppför klippbranter. Den blommar i juli med gulorange väldoftande blommor. De doftar starkast på kvällen och lockar nattflygande insekter med långa sugsnablar, som kan stickas ner i den långa pipen. Frukten är ett rött, giftigt bär. Kaprifol är Bohusläns landskapsblomma. caprifolium betyder getblad. Besksöta och murgröna är de två andra svenska lianerna.



Blåklocka, *Campanula rotundifolia*

Det finns flera olika blåklockor. Detta är en av de vanligaste. Den är spröd och ganska liten. Den blommar i juli-augusti.

rotundifolia betyder runda blad, det är rosettbladen längst ner, som är runda



Röllika, *Achillea millefolium*

Röllikans blomsamling är sammansatt av många små korgar. Den doftar starkt. Färgen är varierande, oftast vit men kan ibland bli röd. Röllikan är en gammal medicinalväxt.

millefolium betyder att den har många småblad



Renfana, *Tanacetum vulgare*

Renfanan saknar strålblommor liksom gatkamomill. De gula knapparna är korgar med många småblommor i stora kvastliknande samlingar. De doftar starkt. Ofta samlas massor med insekter på växten. Många plockar renfana och har den torkad i vas hela vintern.

vulgare betyder vanlig





Baldersbrå, *Matricaria inodora*

Baldersbrå blommar hela sommaren.  
Många tror att den heter prästkrage  
men titta i florán så ser du tydliga  
skillnader.

På stränderna hittar du baldersbrå med  
köttiga blad.


*inodora* betyder luktlös



Gatkamomill, *Chamomilla suaveolens*

Gatkamomill ser ut som en baldersbrå,  
som förlorat strålblommorna. Men det är  
en art utan strålblommor. Den har bara  
de gulgröna blommorna tätt i en korg.

*suaveolens* betyder välluktande



Hästhov, Tussilågo fårfara


Tussilagon kommer tidigt, ibland innan all snön smält bort. Det är en av våra tidigaste vårblommor. Den blommar innan bladen kommer fram. Stjälkarna är täckta med rödbruna fjäll. Efter blomningen får frukterna, fröna, håriga penslar, som flyger iväg med vindens hjälp. Bladen har samma form som en hästhov och kan under sommaren bli mycket stora  
Tussilagon har använts som host-  
medicin.

Tussi betyder hosta, farfara möjlig (bladen är mjöliga på undersidan)



Gullris, Solidågo virgåurea


Gullris blommar under senare delen av sommaren. Den kan bli ganska hög c:a 50-70 cm. Blomkorgarna är gula och sitter samlade i en tät klase.  
solidago=tät  
virgaurea betyder gullris



Korsört, *Senecio vulgaris*

Korsört är en oansenlig växt, som många inte lägger märke till. Den saknar strålblommor och ser ut som om den är i knopp eller har vissnat.

*vulgaris* betyder vanlig



Klibbkorsört, *Senecio viscosus*

Klibbkorsörten är, som namnet anger, starkt klibbig. Den är ofta större än vanliga korsörten och blommorna syns mera. Den har strålblommor fast något bakåtrullade.

*viscosus* betyder klibbig



Liljekonvalj, *Convallaria majalis*

Liljekonvaljen är inte vanlig på Känsö. Den växer endast i parken mellan lusthuset och Erikssons grav. Där växer endast blad, den blommar inte.

majalis betyder att den blommar i maj



Ekorrhör, *Maianthemum bifolium*

Ekorrhör blommar med små vita, väldoftande blommor. Liksom liljekonvaljen får den röda bär och är giftig. Titta på blommorna genom lupp.

bifolium betyder två blad

Påvelunds Tryckeri, Nya Varvet

1996